

## Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

**LAMOX 25 mg tablete**  
**LAMOX 50 mg tablete**  
**LAMOX 100 mg tablete**  
**LAMOX 200 mg tablete**

*lamotrigin*

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

**Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je Lamox i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamox
3. Kako uzimati Lamox
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Lamox
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

### **1. ŠTO JE LAMOX I ZA ŠTO SE KORISTI**

Lamox pripada skupini lijekova pod nazivom *antiepileptici*. Lamox se koristi u liječenju dvaju stanja - **epilepsije** i **bipolarnog poremećaja**.

**Lamox liječi epilepsiju** blokiranjem signala u mozgu koji izazivaju epileptične napadaje.

- U odraslih i djece starije od 13 godina, Lamox se može koristiti sam ili zajedno s drugim lijekovima za liječenje epilepsije. Lamox se također može koristiti zajedno s drugim lijekovima za liječenje napadaja koji se pojavljuju uz stanje pod nazivom Lennox-Gastautov sindrom.
- U djece u dobi između 2 i 12 godina, Lamox se može koristiti zajedno s drugim lijekovima za liječenje navedenih stanja. Ovaj lijek se može koristiti kao samostalna terapija u liječenju jedne vrste epilepsije pod nazivom tipični apsans napadaj.

**Lamox se također koristi u liječenju bipolarnog poremećaja.**

Osobe sa bipolarnim poremećajem (ponekad se naziva *manična depresija*) imaju ekstremne promjene raspoloženja, pri čemu se razdoblja manije (uzbuđenje ili euforija) izmjenjuju s razdobljima depresije (duboka tuga ili očaj). U odraslih starijih od 18 godina, Lamox se može koristiti sam ili zajedno s drugim lijekovima za sprječavanje razdoblja depresije u bipolarnom poremećaju. Još nije poznato na koji način ovaj lijek u mozgu postiže navedeni učinak.

## 2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LAMOX

### Nemojte uzimati Lamox:

- **ako ste alergični** (*preosjetljivi*) na lamotrigin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ako se ovo odnosi na Vas:

→ **Obavijestite liječnika** te ne uzimajte Lamox.

### Upozorenja i mjere opreza

#### Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lamox:

- **ako imate bilo kakvih problema s bubrezima**
- **ako ste ikada imali osip** nakon uzimanja lamotrigina ili drugih lijekova za epilepsiju ili bipolarni poremećaj
- **ako ste ikada razvili meningitis nakon uzimanja lamotrigina** (*pročitati opis simptoma u dijelu 4. ove upute: Moguće nuspojave*)
- **ako već uzimate lijekove koji sadrže lamotrigin**

Ako se nešto od ovoga odnosi na Vas:

→ **Obavijestite liječnika**, koji može odlučiti o snižavanju doze lijeka ili odlučiti da Lamox nije pogodan za Vas.

#### Važne informacije o potencijalno po život opasnim reakcijama

Malen broj ljudi koji uzimaju Lamox dobije alergijsku reakciju ili potencijalno po život opasnu reakciju na koži, koja se može razviti u ozbiljnije probleme ako se ne liječi. One mogu uključivati Stevens-Johnsonov sindrom (SJS), toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN) i reakciju na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS). Potrebno je poznavati simptome na koje treba paziti tijekom primjene Lamoxa.

→ **Pročitajte opis ovih simptoma u dijelu 4. ove upute** pod „*Potencijalno po život opasne reakcije: odmah potražite liječničku pomoć*“.

#### Suicidalne misli ili misli o samoozljeđivanju

Antiepileptici se koriste u liječenju nekoliko stanja, uključujući epilepsiju i bipolarni poremećaj. Osobe s bipolarnim poremećajem mogu ponekad imati misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako imate bipolarni poremećaj, veća vjerojatnost za ovakve misli postoji:

- kada započinjete liječenje
- ako ste prije imali misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu
- ako ste mlađi od 25 godina.

Ako imate uznemirujuće misli ili iskustva, ako primijetite da se lošije osjećate ili se razviju novi simptomi tijekom uzimanja Lamoxa:

→ **Obratite se liječniku ili potražite pomoć u najbližoj bolnici što je prije moguće.**

Mali broj ljudi koji su bili liječeni antiepilepticima kao što je Lamox također su imali misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako u bilo kojem trenutku imate ovakve misli, odmah se javite liječniku.

### **Ako uzimate Lamox za epilepsiju**

Napadaji se u nekim vrstama epilepsije mogu povremeno pogoršati ili pojavljivati češće tijekom uzimanja Lamoxa. Neki bolesnici mogu iskusiti teške napadaje, koji mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Ako Vam se napadaji javljaju češće ili ako dobijete teški napadaj za vrijeme uzimanja Lamoxa:

→ **Obratite se liječniku čim je prije moguće.**

**Lamox se ne smije davati osobama mlađim od 18 godina za liječenje bipolarnog poremećaja.** Lijekovi za liječenje depresije i drugih problema s mentalnim zdravljem, povećavaju rizik od suicidalnih misli i ponašanja u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

### **Drugi lijekovi i Lamox**

**Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove,** uključujući i one koje ste kupili bez recepta te biljne lijekove.

Vaš liječnik treba znati ako uzimate druge lijekove za liječenje epilepsije ili za liječenje problema s mentalnim zdravljem, a kako bi bio siguran da uzimate adekvatnu dozu Lamoxa. Ovi lijekovi uključuju:

- **okskarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramata ili zonisamid,** koji se primjenjuju u liječenju **epilepsije**
- **litij, olanzapin ili aripiprazol,** koji se primjenjuju u liječenju **problema s mentalnim zdravljem**
- **bupropion,** koji se primjenjuje u liječenju **problema s mentalnim zdravljem** ili za **prekid pušenja**

→ **Obavijestite liječnika** ako uzimate neke od spomenutih lijekova.

Neki lijekovi ulaze u interakcije s Lamoxom ili povećavaju vjerojatnost nuspojava. To su sljedeći lijekovi:

- **valproat,** koji se koristi u liječenju **epilepsije i problema s mentalnim zdravljem**
- **karbamazepin,** koji se koristi u liječenju **epilepsije i problema s mentalnim zdravljem**
- **fenitoin, primidon ili fenobarbiton,** koji se koriste u liječenju **epilepsije**
- **risperidon,** koji se koristi u liječenju **problema s mentalnim zdravljem**
- **rifampicin,** koji je **antibiotik**
- lijekovi koji se koriste u liječenju **infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV)** (kombinacija lopinavira i ritonavira ili atazanavira i ritonavira)
- **hormonski kontraceptivi,** kao što su **pilule** (vidi tekst niže)

→ **Obavijestite liječnika,** ako uzimate neke od spomenutih lijekova, ili ako počinjete ili prekidate s njihovom primjenom.

### **Hormonski kontraceptivi (kao što je kontracepcijska pilula) mogu utjecati na način kako djeluje Lamox**

Stoga, Vaš liječnik Vam može preporučiti da uzimate drugu vrstu hormonskih kontraceptiva ili neku drugu metodu kontracepcije kao što su kondomi, dijafragma ili spirala. Ako uzimate hormonske kontraceptive u obliku pilula, liječnik može dati Vaše uzorke krvi na provjeru vrijednosti Lamoxa. Ako uzimate hormonske kontraceptive ili ako ih planirate početi uzimati:

→ **Obavijestite liječnika,** koji će s Vama razmotriti odgovarajuće metode kontracepcije.

Lamox također može utjecati na način djelovanja hormonskih kontraceptiva, iako je mala vjerojatnost da će smanjiti njihovu učinkovitost. Ako uzimate hormonske kontraceptive i

primijetite bilo kakve promjene menstrualnog ciklusa kao što je „probojno“ krvarenje ili krvarenje između menstruacija:

→ **Obavijestite liječnika.** Ovo mogu biti znakovi da Lamox utječe na način kako djeluju kontraceptivi koje primjenjujete.

### **Trudnoća i dojenje**

Može doći do povećanog rizika od urođenih oštećenja u djece čije su majke uzimale Lamox tijekom trudnoće. Ova oštećenja uključuju rascjep usne ili rascjep nepca. Liječnik Vam može savjetovati uzimanje dodatka **folne kiseline** ako planirate trudnoću i tijekom trudnoće.

Trudnoća također može promijeniti učinkovitost Lamoxa, tako da liječnik može dati Vaše uzorke krvi na provjeru vrijednosti Lamoxa te može prilagoditi dozu.

→ **Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne smijete prekinuti s terapijom bez razgovora o tome sa svojim liječnikom.** To je posebno važno ako imate epilepsiju.

→ **Ako dojite ili planirate dojiti, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.** Djelatna tvar Lamoxa prelazi u majčino mlijeko te može utjecati na Vaše dijete. Vaš liječnik će razmotriti rizike i koristi od dojenja tijekom uzimanja Lamoxa, te će povremeno pregledati Vaše dijete ako odlučite dojiti.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Lamox može uzrokovati omaglicu i dvoslike.

→ **Ne upravljajte vozilima ili strojevima, osim ako niste sigurni da lijek nema utjecaj na Vas.**

**Ako imate epilepsiju, posavjetujte se s liječnikom u vezi upravljanja vozilima i strojevima.**

### **Lamox sadrži laktozu**

Laktoza je jedna vrsta šećera. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

## **3. KAKO UZIMATI LAMOX**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

### **Koliko Lamoxa uzeti**

Možda će biti potrebno neko vrijeme dok se ne nađe odgovarajuća doza lijeka za Vas. Doza koju uzimate će ovisiti o:

- Vašoj dobi
- uzimate li Lamox istovremeno s drugim lijekovima
- imate li probleme s bubrezima ili jetrom.

Vaš liječnik će Vam propisati nisku dozu za početak te je postupno povećavati tijekom nekoliko tjedana, sve dok se ne dođe do doze koja je djelotvorna za Vas (naziva se *učinkovita doza*). **Nikada nemojte uzeti više Lamoxa od onoga što Vam je rekao liječnik.**

Uobičajena učinkovita doza Lamoxa za odrasle i djecu stariju od 13 godina iznosi između 100 mg i 400 mg svaki dan.

Za djecu u dobi od 2 do 12 godina, učinkovita doza ovisi o njihovoj tjelesnoj težini – obično se kreće između 1 mg i 15 mg po kilogramu tjelesne težine, sve do maksimalne doze održavanja od 200 mg na dan.

Lamox se ne preporučuje za djecu mlađu od 2 godine.

### **Kako primjenjivati dozu lijeka Lamox**

Uzmite Vašu dozu lijeka Lamox jednom ili dva puta dnevno, kako Vam savjetuje liječnik. Možete ju uzeti sa ili bez hrane.

Vaš liječnik Vam može također savjetovati da počnete ili prestanete uzimati druge lijekove, ovisno o stanju zbog kojeg se liječite i načinu kako reagirate na liječenje.

- **Progutajte cijelu tabletu.** Nemojte lomiti, žvakati ili drobiti tablete.
- **Uvijek uzmite punu dozu** koju Vam je liječnik propisao. Nemojte nikada uzeti samo dio tablete.

### **Ako uzmete više Lamoxa nego što ste trebali**

→ **Odmah se javite liječniku ili odjelu hitne službe u najbližoj bolnici.** Ako je moguće, pokažite pakiranje lijeka Lamox.

Ako ste uzeli previše lijeka Lamox više je vjerojatna pojava ozbiljnih nuspojava koje mogu biti kobne.

Osoba koja je uzela previše Lamoxa može imati neke od sljedećih simptoma:

- brze, nekontrolirane pokrete oka (*nistagmus*)
- nespretnost i manjak koordinacije koji utječe na ravnotežu (*ataksija*)
- promjene srčanog ritma (vidljive na EKG-u)
- gubitak svijesti, napadaji (konvulzije) ili komu.

### **Ako ste zaboravili uzeti Lamox**

**Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.**

→ **Posavjetujte se s liječnikom kako početi s ponovnim uzimanjem.** Ovo je važno učiniti.

### **Ako prestanete uzimati Lamox**

**Ne prekidajte s primjenom lijeka Lamox bez savjeta**

Lamox se primjenjuje toliko dugo koliko to liječnik preporuča. Ne prekidajte, osim ako Vam liječnik tako ne savjetuje.

### **Ako uzimate Lamox za epilepsiju**

Kod prekidanja uzimanja Lamoxa, **važno je da se doza postupno smanjuje** tijekom otprilike 2 tjedna. Ako naglo prestanete uzimati Lamox, epilepsija se može vratiti ili pogoršati.

### **Ako uzimate Lamox za bipolarni poremećaj**

Potrebno je određeno vrijeme da Lamox počne djelovati te je stoga mala vjerojatnost da ćete se odmah početi osjećati bolje. Ako prestanete uzimati Lamox, nije potrebno postupno smanjivati dozu. Unatoč tome, prvo se posavjetujte s liječnikom ako želite prestati uzimati Lamox.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

#### 4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

##### **Potencijalno po život opasne reakcije: odmah potražite liječničku pomoć**

Mali broj ljudi koji uzimaju Lamox dobiju alergijsku reakciju ili potencijalno po život opasnu reakciju na koži, što se može razviti u ozbiljnije probleme ako se ne liječi.

Veća vjerojatnost za pojavu ovih simptoma postoji tijekom prvih nekoliko mjeseci liječenja lijekom Lamox, osobito ako je početna doza previsoka ili ako se doza prebrzo povećava te ako se Lamox uzima zajedno s lijekom pod nazivom *valproat*. Neki od ovih simptoma su češći u djece, stoga roditelji moraju biti osobito oprezni i paziti na njih.

Simptomi ovih reakcija uključuju:

- **osipe ili crvenilo na koži**, koji se mogu razviti u po život opasne reakcije na koži, uključujući vrlo rašireni osip s mjehurima i ljuštenjem kože, osobito u predjelu usta, nosa, očiju i genitalija (*Stevens-Johnsonov sindrom*), opsežno ljuštenje kože (više od 30% tjelesne površine–*toksična epidermalna nekroliza*) ili generalizirani osip sa zahvaćenjem jetre, krvi i drugim organima tijela (reakcija na lijek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima poznata kao sindrom preosjetljivosti )
- **ulceracije u ustima, grlu, nosu ili genitalijama**
- **bolna usta ili crvene i natečene oči** (*konjunktivitis*)
- **visoka temperatura** (vrućica), simptomi slični gripi ili omamljenost
- **otečenost oko lica**, ili **otečene žlijezde** na vratu, pod pazuhom ili u preponama
- **neočekivano krvarenje ili pojava modrica**, ili plavljenje prstiju
- **grlobolja**, ili više infekcija (kao što su prehlade) nego obično
- povećane vrijednosti enzima jetre u testovima krvi
- povećanje broja određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofili)
- povećani limfni čvorovi
- zahvaćenost organa u tijelu uključujući jetru i bubrege

U mnogim slučajevima, ovi simptomi će biti znakovi manje ozbiljnih nuspojava. **Unatoč tome, morate biti svjesni da su one potencijalno opasne po život** te da se, ako se ne liječe, **mogu razviti u ozbiljnije probleme**, kao što je zatajenje organa. Ako primijetite neke od ovih simptoma:

→ **odmah se javite liječniku**. Vaš liječnik će možda odlučiti napraviti testove jetrene i bubrežne funkcije te krvnu analizu i možda će Vam reći da prekinete uzimati Lamox. U slučaju da razvijete Steven-Johnsonov sindrom ili toksičnu epidermalnu nekrolizu Vaš liječnik će Vam reći da više nikada ne smijete koristiti lamotrigin.

##### **Vrlo česte nuspojave**

One pogađaju **više od 1 na 10** osoba:

- glavobolja
- osip na koži

##### **Česte nuspojave**

One pogađaju **manje od 1 na 10** osoba:

- agresija ili razdražljivost
- osjećaj pospanosti ili omamljenosti
- osjećaj omaglice
- tresenje ili nevoljno drhtanje (tremor)
- problemi sa spavanjem (*insomnija*)
- osjećaj uznemirenosti
- proljev
- suhoća usta
- osjećaj mučnine ili povraćanje
- osjećaj umora
- bolovi u leđima ili zglobovima, ili drugdje.

### Manje česte nuspojave

One pogađaju **manje od 1 na 100** osoba:

- nespretnost i nedostatak koordinacije (*ataksija*)
- dvoslike ili zamućen vid

### Rijetke nuspojave

One pogađaju **manje od 1 na 1000** osoba:

- po život opasne reakcije na koži (*Stevens-Johnsonov sindrom*): vidi također informacije na početku dijela 4.)
- Skupina simptoma koji zajedno uključuju:
  - vrućicu, mučninu, povraćanje, glavobolju, ukočen vrat i iznimnu osjetljivost na jaku svjetlost.

Ovo može biti izazvano upalom membrana koje prekrivaju mozak i leđnu moždinu (*meningitis*). Ti simptomi obično nestaju s prekidom uzimanja lijeka. U slučaju da su simptomi i dalje prisutni ili se pogoršaju, **obratite se svojem liječniku.**
- brzi, nekontrolirani pokreti oka (*nistagmus*)
- svrbež očiju, s iscjetkom ili sasušanim sekretom na kapcima (*konjunktivitis*)

### Vrlo rijetke nuspojave

One pogađaju **manje od 1 na 10 000** osoba:

- po život opasna reakcija na koži (*toksična epidermalna nekroliza*): vidi također informacije na početku dijela 4.)
- reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS): (vidi također informacije na početku dijela 4)
- visoka temperatura (*vrućica*); (vidi također informacije na početku dijela 4)
- otečenost oko lica (*edem*), ili otečene žlijezde na vratu, pod pazuhom ili u preponama (*tzv. limfadenopatija*); (vidi također informacije na početku dijela 4)
- promjene u funkciji jetre, koje će se pokazati na nalazima krvi, ili zatajenje jetre; (vidi također informacije na početku dijela 4)
- ozbiljni poremećaj zgrušavanja krvi, što može dovesti do neočekivanog krvarenja ili pojave modrica (*diseminirana intravaskularna koagulacija*); vidi također informacije na početku dijela 4)
- promjene koje se mogu pojaviti u nalazima krvi - uključujući smanjeni broj crvenih krvnih stanica (*anemija*), smanjeni broj bijelih krvnih stanica (*leukopenija, neutropenija, agranulocitoza*), smanjeni broj trombocita (*trombocitopenija*), smanjeni broj svih ovih tipova stanica (*pancitopenija*), te poremećaj koštane srži koji se naziva *aplastična anemija*
- halucinacije (vide se ili čuju stvari koje nisu zbilja tamo)

- smetenost
- osjećaj nesigurnosti ili nestabilnosti prilikom kretanja
- nekontrolirani pokreti tijela (*tikovi*), nekontrolirani mišićni grčevi koji zahvaćaju oči, glavu i gornji dio trupa (*koreoatetozu*), ili drugi neuobičajeni pokreti tijela kao što su trzanje, tresenje ili ukočenost
- češći napadaji u osoba koje već imaju epilepsiju
- u osoba koje već imaju Parkinsonovu bolest, pogoršanje simptoma
- reakcija slična lupusu (simptomi koji uključuju: bol u leđima ili zglobovima koji ponekad mogu biti popraćeni vrućicom i/ili općim lošim osjećanjem).

### **Ostale nuspojave**

Ove nuspojave se javljaju u malog broja osoba, ali njihova točna učestalost nije poznata:

- Prijavljeni su slučajevi poremećaja kostiju uključujući osteopeniju i osteoporozu (smanjenje gustoće kostiju), te prijelome. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako se dugotrajno liječite lijekovima za liječenje epilepsije, ako imate osteoporozu ili uzimate steroide.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju

Ksaverska cesta 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Fax: + 385 (0)1 4884 110

Website: [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr)

e-mail: [nuspojave@halmed.hr](mailto:nuspojave@halmed.hr)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. KAKO ČUVATI LAMOX**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE**

### **Što Lamox sadrži**

Djelatna tvar je lamotrigin.

Jedna tableta sadrži 25 mg, 50 mg, 100 mg ili 200 mg lamotrigina.

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; povidon (K-30); natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat; talk; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; željezov oksid, žuti (E172).



**Kako Lamox izgleda i sadržaj pakiranja**

Lamox tablete su svijetlo žute okrugle, plosnate neobložene tablete s razdjelnim urezom na jednoj strani. Pakirane su u blisteru, ukupno 30 tableta u kutiji.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet**

Farmal d.d., 42230 Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska

**Ime i adresa proizvođača Lamox 25 mg, 50 mg i 100 mg tableta**

Farmal d.d., 42230 Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Republika Hrvatska  
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Strasse 15, 06796 Brehna, Njemačka

**Ime i adresa proizvođača Lamox 200 mg tableta**

Farmal d.d., 42230 Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Republika Hrvatska

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju, 2015.**