

## Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

### Meliam 15 mg tablete

*meloksikam*

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je Meliam i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Meliam?
3. Kako uzimati Meliam?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Meliam?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što je Meliam i za što se koristi?**

Meliam sadrži djelatnu tvar meloksikam. Meloksikam pripada skupini lijekova koji se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi ili nesteroidni antireumatici (NSAIL). Lijekovi iz ove skupine primjenjuju se za ublažavanje upale i bolova u zglobovima i mišićima.

Meliam se koristi kod odraslih bolesnika za:

- kratkotrajno liječenje pogoršanja osteoartritisa
- dugotrajno liječenje:
  - reumatoidnog artritisa
  - ankilozantnog spondilitisa (također poznatog kao Bechterewova bolest)

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Meliam?**

##### **Nemojte uzimati Meliam:**

- ako ste alergični na meloksikam ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- tijekom posljednja tri mjeseca trudnoće
- djeca i adolescenati mlađi od 16 godina
- ako ste alergični (preosjetljivi) na acetilsalicilnu kiselinu ili druge NSAIL.
- u slučaju nekih od sljedećih znakova nakon uzimanja acetilsalicilne kiseline ili drugih NSAIL:
  - piskanje pri disanju, stezanje u prsnoj koži, nedostatak zraka (astma)
  - začepljenost nosa zbog otečene sluznice nosa (nazalni polipi)
  - kožni osipi / koprivnjača (urtikarija)
  - iznenadna otečenost kože ili sluznica, kao što je otečenost područja oko očiju, lica, usnica, usta ili grla, što može otežati disanje (angioneurotski edem)
- nakon prethodne terapije NSAIL-ima i anamnezom:
  - krvarenja u želucu ili crijevima
  - rupe (perforacije) u želucu ili crijevima
- ako imate čireve (ulkuse) ili krvarenje u želucu ili crijevima
- ako imate anamnezu ili nedavne želučane ili peptičke čireve (ulkuse) ili krvarenje (ulceracija ili krvarenje koje se pojavilo najmanje dva puta)
- aktivne upalne bolesti crijeva (Chronova bolest ili ulcerozni kolitis)
- ako imate teško oštećenje funkcije jetre
- ako imate teško zatajenje bubrega a ne idete na dijalizu

- ako ste imali nedavno krvarenje u mozgu (cerebrovaskularno krvarenje)
- ako imate bilo kakvu vrstu poremećaja krvarenja
- ako imate teško zatajenje srca
- ako imate nepodnošenje nekih šećera jer ovaj lijek sadrži laktozu (vidjeti također „*Meliam sadrži laktozu*“).

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od prethodno navedenog na Vas, molimo obratite se liječniku.

### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Meliam.

#### **Upozorenja**

Lijekovi poput Meliama mogu biti povezani s malo povećanim rizikom od srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara (apopleksija). Rizik je veći što je veća doza i što se lijek dulje uzima. Nemojte uzimati više od preporučene doze. Nemojte uzimati Meliam dulje nego što Vam je propisano (vidjeti dio „*Kako uzimati Meliam?*“).

Ako imate srčanih problema, imali ste moždani udar ili smatrate da imate povećani rizik za ova stanja, trebate se posavjetovati oko liječenja sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Primjerice ako:

- imate visoki krvni tlak (hipertenziju)
- imate visoke razine šećera u krvi (dijabetes melitus)
- imate visoke vrijednosti kolesterola u krvi (hiperkolesterolemiju)
- ste pušač

Ako dođe do razvoja teške alergijske reakcije, potrebno je odmah prekinuti s primjenom Meliama odnosno nakon prve pojave osipa na koži, lezija mekog tkiva (mukozne lezije), ili drugog znaka alergije, te se odmah obratite liječniku.

Odmah prestanite uzimati Meliam čim primijetite krvarenje (koje uzrokuje stolicu boje katrana) ili ulceraciju u probavnom sustavu (koja izaziva abdominalnu bol).

Meliam nije prikladan ako Vam je potrebno trenutno olakšanje od akutne boli.

Meliam može prikriti simptome infekcije (npr. vrućice). Ako mislite da imate infekciju, trebate se obratiti Vašem liječniku.

Meliam može otežati začecje. Potrebno je obavijestiti liječnika ako planirate trudnoću ili ako imate probleme sa začecjem.

#### **Mjere opreza**

Budući da će biti nužno prilagoditi liječenje, važno je posavjetovati se s liječnikom prije nego uzmete Meliam u slučaju:

- upale jednjaka (ezofagitis) ili upale sluznice želuca (gastritis) u povijeti bolesti ili neke druge bolesti probavnog sustava (npr. ulcerozni kolitis ili Chronova bolest) u povijeti bolesti
- visokog krvnog tlaka (hipertenzija)
- starije dobi
- bolesti srca, jetre ili bubrega
- visokih razina šećera u krvi (dijabetes melitus)
- smanjenog volumena krvi (hipovolemija) koji se može pojaviti ako imate ozbiljan gubitak krvi ili opekline, operaciju ili mali unos tekućine
- nepodnošenja nekih šećera dijagnosticiranog od strane Vašeg liječnika jer ovaj lijek sadrži laktozu
- visokih vrijednosti kalija u krvi prethodno dijagnosticiranih od strane Vašeg liječnika.

Vaš liječnik će Vas morati pratiti tijekom liječenja.

## **Djeca i adolescenti**

Lijek Meliam se ne smije primijenjivati u djece i adolescenata ispod 16 godina starosti.

## **Drugi lijekovi i Meliam**

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Meliam može utjecati na druge lijekove i drugi lijekovi mogu utjecati na Meliam.

Osobito recite Vašem liječniku ili ljekarniku ako uzimate/ste uzimali ili primjenjujete nešto od sljedećeg:

- druge NSAIL
- lijekove koji sprečavaju zgrušavanja krvi
- lijekove koji razbijaju krvne ugruške (trombolitici)
- lijekove za liječenje srčanih i bubrežnih bolesti
- kortikosteroide (npr. koji se koriste protiv upale ili alergijskih reakcija)
- ciklosporin - lijek koji se uzima nakon transplantacije organa, ili kod teških kožnih bolesti, reumatoidnog artritisa ili nefrotskog sindroma
- bilo koji diuretik (lijek za izmokravanje). Vaš liječnik može pratiti funkciju Vaših bubrega ako uzimate diuretike.
- lijekove za visoki krvni tlak (npr. beta-blokatori)
- litij - lijek koji se primjenjuje kod poremećaja raspoloženja
- selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) – koriste se za liječenje depresije
- metotreksat - lijek koji se koristi za liječenje tumora ili teških nekontroliranih stanja kože i aktivnog reumatoidnog artritisa
- kolestiramin - lijek koji se koristi za snižavanje vrijednosti kolesterola
- ako ste žena koja koristi intrauterini kontracepcijski uložak (obično poznat kao „spirala“) kao kontracepcijsko sredstvo

Ako ste u dvojbi, upitajte liječnika ili ljekarnika.

## **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

## **Plodnost**

Meliam može otežati začeće. Potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ako planirate trudnoću ili ako imate problema sa začećem.

## **Trudnoća**

Ako je utvrđena trudnoća tijekom primjene Meliama, potrebno je obavijestiti liječnika.

Tijekom prvih 6 mjeseci trudnoće, Vaš liječnik može propisati ovaj lijek ako je nužno.

Tijekom zadnja tri mjeseca trudnoće, nemojte uzimati ovaj lijek jer Meliam može imati ozbiljne posljedice na Vaše dijete, osobito na srce, pluća i bubrege, čak i uz samo jednu primjenu.

## **Dojenje**

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka tijekom dojenja.

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

## **Upravljanje vozilima i strojevima**

Prilikom uzimanja ovog lijeka mogu se javiti poremećaji vida uključujući zamagljen vid, omaglica, omamljenost, vrtoglavica ili drugi poremećaji središnjeg živčanog sustava. U takvim slučajevima nemojte voziti ili rukovati strojevima.

## **Meliam sadrži laktozu.**

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

### **3. Kako uzimati Meliam?**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Meliam tablete namijenjene su liječenju odraslih i adolescenata starijih od 16 godina.

#### **Preporučeno doziranje:**

##### **Pogoršanje osteoartritisa**

7,5 mg (pola tablete od 15 mg) jednom dnevno. Doza se može povećati na 15 mg (1 tableta od 15 mg) jednom dnevno.

##### **Reumatoidni artritis**

15 mg (jedna tableta od 15 mg) jednom dnevno. Doza se može smanjiti na 7,5 mg (pola tablete od 15 mg) jednom dnevno.

##### **Ankilozantni spondilitis**

15 mg (jedna tableta od 15 mg) jednom dnevno. Doza se može smanjiti na 7,5 mg (pola tablete od 15 mg) jednom dnevno.

Tablete treba progutati s vodom ili drugom tekućinom, tijekom obroka.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

#### **Nemojte prekoračiti maksimalnu dozvoljenu dnevnu dozu od 15 mg/dan.**

Ako se neka od tvrdnji navedenih pod naslovom „Upozorenja i mjere opreza“ odnosi na Vas, Vaš liječnik može ograničiti dozu na 7,5 mg (pola tablete od 15 mg) jednom dnevno.

Kombinirana primjena različitih dozirnih oblika meloksikama (tablete, otopina za injekciju) ne smije prekoračiti ukupnu dnevnu dozu od 15 mg. Na tržištu se ne moraju nalaziti svi navedeni farmaceutski oblici meloksikama.

#### **Meliam se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata ispod 16 godina starosti.**

Ako smatrate da je učinak Meliama prejak ili preslab, ili ako nakon nekoliko dana uzimanja ne osjećate nikakvo poboljšanje Vašeg stanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

#### **Ako uzmete više Meliama nego što ste trebali**

Ako ste uzeli previše tableta ili sumnjate na predoziranje, odmah se obratite Vašem liječniku ili otidite u najbližu bolnicu.

Simptomi akutnog predoziranja NSAIL lijekovima obično su ograničeni na:

- nedostatak energije (letargija)
- omamljenost
- mučninu i povraćanje
- bol u području trbuha (epigastrična bol)

Ovi simptomi se obično ublažavaju kada prestanete uzimati Meliam. Možete imati krvarenje u želucu ili crijevima (gastrointestinalno krvarenje).

Teško trovanje može imati za posljedicu ozbiljnu reakciju na lijek (vidjeti dio 4.):

- visoki krvni tlak (hipertenzija)
- akutno zatajenje bubrega (renalno zatajenje)
- disfunkcija jetre (hepatička disfunkcija)
- smanjenje/zaravnjenje ili zastoj disanja (respiratorna depresija)
- gubitak svijesti (koma)
- napadaji (konvulzije)
- kolaps cirkulacije krvi (kardiovaskularni kolaps)

- zastoj srca (srčani arrest)
- trenutne alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti), uključujući:
  - nesvjesticu
  - nedostatak zraka
  - reakcije na koži

#### **Ako ste zaboravili uzeti Meliam**

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Samo uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

#### **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

**Odmah prestanite uzimati Meliam i obratite se liječniku ili otidite u najbližu bolnicu ako primijetite:**

Bilo koju alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) koja se može pojaviti u obliku:

- kožnih reakcija kao što je svrbež (pruritus), stvaranje mjehura ili ljuštenje kože koje mogu predstavljati kožne osipe potencijalno opasne po život (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza), lezije mekog tkiva (mukozne lezije) ili erythema multiforme (multiformni eritem) (vidjeti dio 2.). Erythema multiforme (multiformni eritem) je ozbiljna alergijska kožna reakcija koja uzrokuje mrlje, crvene fleke ili ljubičasta područja ili mjehure na koži. Također može zahvatiti usta, oči i druge vlažne površine tijela.
- otečenosti kože ili sluznica, kao što je otečenost oko očiju, lica i usnica, usta ili grla što može otežavati disanje, te oticanje gležnjeva ili nogu (edem donjih udova)
- nedostatka zraka ili napada astme
- upale jetre (hepatitis). To može uzrokovati simptome kao što su:
  - žuta obojenost kože ili očnih jabučica (žutica)
  - bol u trbuhu
  - gubitak apetita

Bilo koju nuspojavu u probavnom sustavu, osobito:

- krvarenje (koje uzrokuje stolicu boje katrana)
- ulceraciju (čir) u probavnom sustavu (koji uzrokuje bol u trbuhu)

Krvarenje u probavnom sustavu (gastrointestinalno krvarenje), nastanak čireva ili nastanak puknuća u probavnom sustavu (perforacija) koji mogu ponekad biti teški, s mogućnošću smrtnog ishoda, osobito u starijih osoba.

Ako ste prethodno već imali bilo kakve simptome probavnog sustava zbog dugotrajne primjene NSAID, potražite odmah liječnički savjet, osobito ako ste starije dobi. Vaš liječnik će možda nadzirati Vaš napredak dok ste na liječenju.

Ako imate smetnje vida, nemojte voziti ili upravljati strojevima.

#### **Općenite nuspojave NSAID**

Primjena nekih NSAID može biti povezana s malo povećanim rizikom od začepljenja arterija (arterijski trombotski događaji), npr. srčani udar (infarkt miokarda) ili moždani udar (apopleksija), osobito kod primjene visokih doza te kod dugotrajnog liječenja.

Zadržavanje tekućine (edem), visoki krvni tlak (hipertenzija) i zatajenje srca su prijavljeni u vezi s liječenjem NSAID.

Najčešće primjećene nuspojave zahvaćaju probavni sustav (gastrointestinalni događaji):

- čirevi (ulkusi) želuca i gornjeg dijela tankog crijeva (gastrointestinalni/gastroduodenalni ulkusi)
- puknuće u stijenci crijeva (perforacija) ili krvarenje u probavnom sustavu (ponekad sa smrtnim ishodom, osobito u starijih osoba)

Sljedeće nuspojave su prijavljene nakon primjene NSAIL:

- mučnina i povraćanje
- proljev
- nadutost
- konstipacija (zatvor)
- probavne tegobe /smetnje (dispepsija)
- bol u trbuhu
- stolica boje katrana zbog krvarenja u probavnom sustavu (melena)
- povraćanje krvi (hematemeza)
- upala sa stvaranjem ranica u ustima (ulcerativni stomatitis)
- pogoršanje upale probavnog sustava (npr. egzacerbacija kolitisa ili Chronove bolesti)

Manje često je primijećena upala želuca (gastritis).

### **Nuspojave meloksikama – djelatne tvari Meliama**

**Vrlo često:** mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

- probavne tegobe /smetnje (dispepsija)
- mučnina, povraćanje
- bol u trbuhu
- zatvor (konstipacija)
- nadutost
- rijetka stolica (proljev)

**Često:** mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

- glavobolja

**Manje često:** mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

- osjećaj omaglice ili vrtnje (vrtoglavica)
- izrazita pospanost (omamljenost)
- anemija (smanjenje koncentracije crvenog krvnog pigmenta hemoglobina)
- povišenje krvnog tlaka (hipertenzija)
- napadaji vrućine (prolazno crvenilo lica i vrata)
- zadržavanje natrija i vode
- povećane razine kalija (hiperkalemija)  
To može dovesti do simptoma kao što su:
  - promjene u otkucajima srca (aritmije)
  - palpitacije (osjećaj lupanja srca)
  - slabost mišića
- podrigivanje (eruktacija)
- upala želuca (gastritis)
- krvarenje u probavnom sustavu
- upala usta (stomatitis)
- trenutne alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti)
- svrbež (pruritus)
- osip na koži
- otečenost izazvana zadržavanjem tekućine (edem), uključujući otečene gležnjeve/noge (edem donjih udova)
- iznenadna otečenost kože ili sluznica kao što je otečenost oko očiju, lica, usnica, usta ili grla što može otežati disanje (angioneurotski edem)
- trenutni poremećaj testova jetrene funkcije (npr. povišeni jetreni enzimi poput transaminaza ili povećanje žučnog pigmenta bilirubina). Ovo može otkriti Vaš liječnik putem nalaza krvi.
- poremećaj laboratorijskih nalaza koji pokazuju bubrežnu funkciju (npr. povišen kreatinin ili ureja)

**Rijetko:** mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

- poremećaji raspoloženja
  - noćne more
  - abnormalna krvna slika, uključujući:
    - abnormalna diferencijalna krvna slika
    - smanjen broj bijelih krvnih stanica (leukocitopenija)
    - smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija)
- Ove nuspojave mogu dovesti do povećanog rizika od infekcija i simptoma kao što su nastanak modrica i krvarenje iz nosa.
- zvonjenje u ušima (tinitus)
  - osjećaj lupanja srca (palpitacije)
  - čirevi (ulkusi) želuca ili gornjeg dijela tankog crijeva (gastrointestinalni/gastroduodenalni ulkusi)
  - upala jednjaka (ezofagitis)
  - nastup astmatičnih napada (opaženo kod ljudi koji su alergični na acetilsalicilnu kiselinu ili druge NSAID)
  - teški oblici mjehura na koži ili ljuštenje kože (Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza)
  - koprivnjača (urtikarija)
  - poremećaji vida uključujući:
    - zamagljen vid
    - konjunktivitis (upala očne jabučice ili očnih kapaka)
  - upala debelog crijeva (kolitis)

**Vrlo rijetko:** mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

- reakcije stvaranja mjehura na koži (bulozne reakcije) i erythema multiforme (multiformni eritem). Erythema multiforme je ozbiljna alergijska kožna reakcija koja uzrokuje mrlje, crvene fleke ili ljubičasta područja ili mjehure na koži. Također može zahvatiti usta, oči i druge vlažne površine tijela.
- upala jetre (hepatitis). To može uzrokovati simptome kao što su:
  - žuta obojenost kože ili očnih jabučica (žutica)
  - bol u trbuhu
  - gubitak apetita
- akutno zatajenje bubrega, osobito u bolesnika s faktorima rizika kao što je srčana bolest, šećerna bolest ili bubrežna bolest
- puknuće u stijenci crijeva (perforacija)

**Nepoznato:** učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- smetenost
- dezorijentiranost
- upala gušterače
- nedostatak zraka i kožne reakcije (anafilaktične/anafilaktoidne reakcije), osipi uzrokovani izlaganjem sunčevom svjetlu (reakcije fotoosjetljivosti)
- zatajenje srca je prijavljeno u vezi s liječenjem NSAID lijekovima
- potpuni gubitak specifične vrste bijelih krvnih stanica (agranulocitoza), osobito u bolesnika koji uzimaju Meliam zajedno s drugim lijekovima koji imaju potencijalni inhibitorski, depresivni ili destruktivni učinak na komponentu koštane srži (mijelotoksični lijekovi). To može uzrokovati:
  - iznenadnu vrućicu
  - upalu grla
  - infekcije

**Nuspojave uzrokovane NSAID, ali nisu još primijećene nakon uzimanja meloksikama**

Promjene u strukturi bubrega koje rezultiraju akutnim zatajenjem bubrega:

- vrlo rijetki slučajevi upale bubrega (intersticijski nefritis)

- smrt nekih stanica unutar bubrega (akutna tubularna ili papilarna nekroza)
- proteini u urinu (nefrotski sindrom s proteinurijom)

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED),

Website: [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

### **5. Kako čuvati Meliam?**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

### **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

#### **Što Meliam sadrži?**

- Djelatna tvar je meloksikam. Jedna tableta sadrži 15 mg meloksikama.
- Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat; natrijev citrat; krosповidon.

#### **Kako Meliam izgleda i sadržaj pakiranja?**

Meliam 15 mg tablete su svijetlo žute, okrugle, bikonveksne tablete kosih rubova, sa slovom B i brojkom 19 utisnutima sa svake strane ureza na jednoj strani tablete, promjera 9 mm . Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Pakirane su po 20 (2x10) tableta u blisteru, u kutiji.

#### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

##### **Nositelja odobrenja:**

Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, 42230 Ludbreg

##### **Proizvođač:**

mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Strasse 15, 06796 Brehna, Njemačka

##### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2017.**